96

MÉMOIRE

SUR

La détermination des fonctions Y et Z qui satisfont à l'équation $4(x^n - 1) = (x - 1)(Y^2 \pm nZ^2)$, n étant un nombre premier $4i \mp 1$.

PAR M. LEGENDRE

Lu à l'Académie, le 11 octobre 1830.

DANS les articles 511 et 512 de ma Théorie des nombres, troisième édition, j'ai donné des règles fort simples pour calculer les coefficients de la fonction Y qui satisfait à l'équation $4X = Y^2 \pm nZ^2$, où l'on désigne par n le nombre premier $4i \mp 1$ et par X le quotient de $x^n - 1$ divisé par $x - 1$. Ces règles sont fondées sur la supposition que les coefficients des différents termes de la fonction Y sont moindres que $\frac{1}{2}n$, en les prenant avec le signe convenable; cette propriété a lieu en effet pour toutes les valeurs de n comprises dans le tableau de l'art. 512, et elle se vérifierait également pour quelques-unes des valeurs suivantes, mais elle cesse d'avoir lieu pour des valeurs plus grandes et il arrive au contraire que les coefficients de x dans la fonction Y, loin d'être plus

petits que $\frac{1}{2}n$, deviennent progressivement plus grands que n , à mesure que n augmente, même plus grands que n^2 , n^3 , etc. Les règles dont nous parlons ne font donc plus connaître les vrais coefficients de Y , mais seulement les restes de ces coefficients divisés par n , ce qui peut être utile pour vérifier les valeurs calculées par d'autres méthodes, et il en résulte toujours, conformément à ce qui a été dit dans l'article 511, que le polynôme Y , dont les premiers termes sont $2x^m + x^{m-1} + \frac{3-n}{4}x^{m-2} + \text{etc.}$ contient nécessairement tous ses termes au nombre de $m+1$ sans qu'aucun d'eux puisse devenir nul, ce qui n'a pas toujours lieu pour le polynôme Z du degré $m-1$, qui peut être complet ou incomplet suivant les différents cas. Voici maintenant une méthode sûre et exacte pour déterminer, dans tous les cas, les polynômes Y et Z qui satisfont à l'équation $4X = Y' \pm nZ'$.

Soit d'abord $n=4i+1$ ou $m=2i$, valeur qui répond à l'équation $4X = Y' - nZ'$, si on fait en général

$$Y + Z\sqrt{n} = 2x^m + A_1x^{m-1} + A_2x^{m-2} + A_3x^{m-3} + \text{etc.}$$

la forme connue des polynômes Y et Z étant

$$\begin{aligned} Y &= 2x^m + x^{m-1} + a_1x^{m-2} + a_2x^{m-3} + \text{etc.} \\ Z &= x^{m-1} + b_1x^{m-2} + b_2x^{m-3} + \text{etc.} \end{aligned}$$

on aura les relations suivantes entre les coefficients A, a, b :

$$A_1 = 1 + \sqrt{n}, \quad A_2 = a_1 + b_1\sqrt{n}, \quad A_3 = a_2 + b_2\sqrt{n},$$

et en général $A_i = a_i + b_i\sqrt{n}$; ainsi pour avoir les valeurs des fonctions Y et Z , il suffira de connaître celles des coefficients A_1, A_2 , etc.

Soit g l'une des racines primitives du nombre premier n ; si l'on désigne par α l'un des termes de la suite

$$1, g^3, g^4, g^5, \dots, g^{n-1}, \quad (1)$$

et par ϵ l'un des termes de la suite

$$g, g^3, g^4, g^7, \dots, g^{n-1},$$

on sait que ces deux suites de nombres, diminués des multiples de n qu'ils peuvent contenir, donnent par leur réunion la suite des nombres naturels $1, 2, 3, \dots, n-1$; on sait de plus que r étant l'une quelconque des racines imaginaires de l'équation $r^n - 1 = 0$, le produit de tous les facteurs $x - r^\alpha$, sera égal à l'un des deux polynômes $\frac{1}{2}(Y + Z\sqrt{n})$, $\frac{1}{2}(Y - Z\sqrt{n})$, et le produit de tous les facteurs $x - r^\epsilon$ sera égal à l'autre polynôme; d'ailleurs comme le signe de $\sqrt{n}$ peut être pris à volonté, on pourra supposer généralement

$$\begin{aligned} & (x-r)(x-r^{g^2})(x-r^{g^4}) \dots (x-r^{g^{n-1}}) \\ & = x^n + \frac{1}{2}A_1x^{n-1} + \frac{1}{2}A_2x^{n-2} + \frac{1}{2}A_3x^{n-3} + \text{etc.} \end{aligned}$$

Appelons S , la somme des racines r^α , S_2 la somme de leurs carrés $r^{2\alpha}$, S_3 la somme de leurs cubes $r^{3\alpha}$, etc.; ces sommes étant supposées connues, on pourra déterminer les coefficients A_1, A_2, A_3 , etc., au moyen des équations suivantes:

(1) La suite des valeurs de α est aussi représentée dans un autre ordre, par celle des carrés $1, 4, 9, 16, \dots, m^2$, diminués des multiples de n qu'ils peuvent contenir.

$$\begin{aligned}
 & -\frac{1}{2}A_1 = S_1, \\
 & -2 \cdot \frac{1}{2}A_2 = S_1 + S_2 \cdot \frac{1}{2}A_1, \\
 (1) \quad & -3 \cdot \frac{1}{2}A_3 = S_1 + S_2 \cdot \frac{1}{2}A_1 + S_3 \cdot \frac{1}{2}A_2, \\
 & -4 \cdot \frac{1}{2}A_4 = S_1 + S_2 \cdot \frac{1}{2}A_1 + S_3 \cdot \frac{1}{2}A_2 + S_4 \cdot \frac{1}{2}A_3, \\
 & -5 \cdot \frac{1}{2}A_5 = S_1 + S_2 \cdot \frac{1}{2}A_1 + S_3 \cdot \frac{1}{2}A_2 + S_4 \cdot \frac{1}{2}A_3 + S_5 \cdot \frac{1}{2}A_4 \\
 & \text{etc.}
 \end{aligned}$$

A l'égard de la somme désignée en général par S_k , elle ne peut avoir que l'une des deux valeurs $-\frac{1}{2} + \frac{1}{2}\sqrt{n}$, $-\frac{1}{2} - \frac{1}{2}\sqrt{n}$.

On peut supposer $S_k = -\frac{1}{2} - \frac{1}{2}\sqrt{n}$, et alors on aura

$$S_k = -\frac{1}{2} - \frac{1}{2}\sqrt{n}, \text{ si } k \text{ appartient à la série des nombres } a;$$

et

$$S_k = -\frac{1}{2} + \frac{1}{2}\sqrt{n}, \text{ si } k \text{ appartient à la série des nombres } b.$$

Dans le premier cas, le nombre k serait un résidu quadratique de n , et on aurait, suivant la notation ordinaire,

$$\left(\frac{k}{n}\right) = 1; \text{ dans le second cas, le nombre } k \text{ serait un non-}$$

résidu et on aurait $\left(\frac{k}{n}\right) = -1$; donc dans tous les cas on

aura, au moyen du symbole $\left(\frac{k}{n}\right)$,

$$(2) \quad S_k = -\frac{1}{2} - \frac{1}{2}\sqrt{n} \cdot \left(\frac{k}{n}\right).$$

Étant donnés n et k , on pourra toujours déterminer *a priori* celle des deux valeurs $+1$ et -1 qui convient au symbole

$\left(\frac{k}{n}\right)$. Ainsi on connaîtra successivement toutes les sommes

S_1, S_2, S_3 , etc., ce qui permettra de déterminer les coefficients

A_1, A_2, A_3 , par le moyen des équations (1). Ensuite la fonction $2x^n + A_1x^{n-1} + A_2x^{n-2} + A_3x^{n-3} + \text{etc.}$ prendra la forme

$$2x^n + (1 + \sqrt{n})x^{n-1} + (a_1 + b_1\sqrt{n})x^{n-2} \\ + (a_2 + b_2\sqrt{n})x^{n-3} + \text{etc.}$$

d'où l'on tire les valeurs séparées des fonctions Y et Z, savoir :

$$Y = 2x^n + x^{n-1} + a_1x^{n-2} + a_2x^{n-3} + \text{etc.} \\ Z = x^{n-1} + b_1x^{n-2} + b_2x^{n-3} + \text{etc.}$$

Telle est la méthode par laquelle on trouvera les fonctions Y et Z qui satisfont à l'équation $4X = Y^2 - nZ^2$, lorsque le nombre premier n est de la forme $4i + 1$; elle servira également à résoudre l'équation $4X = Y^2 + nZ^2$, lorsque le nombre premier n est de la forme $4i - 1$. Il suffira pour cela de mettre $-n$ à la place de n dans la valeur de S_1 , c'est-à-dire, de prendre $S_1 = -\frac{1}{2} - \frac{1}{2}\sqrt{-n}$; on déterminera ensuite généralement S_k au moyen de la formule $S_k = -\frac{1}{2} - \frac{1}{2}\sqrt{-n} \cdot \left(\frac{k}{n}\right)$ en y substituant la valeur particulière de $\left(\frac{k}{n}\right)$ qu'on peut toujours trouver *a priori*. Alors connaissant par les équations (1) les valeurs des coefficients A, A_1, A_2 , etc. qui seront tous de la forme $a + b\sqrt{-n}$, on en déduira comme ci-dessus la valeur de la fonction $2x^n + A_1x^{n-1} + A_2x^{n-2} + \text{etc.}$, et ensuite celles des fonctions Y et Z.

EXEMPLE I.

Pour continuer le tableau de l'art. 512, prenons $n = 31$. Comme les diverses valeurs de S_k ne peuvent être que P et Q, savoir $P = -\frac{1}{2} - \frac{1}{2}\sqrt{n}$, $Q = -\frac{1}{2} + \frac{1}{2}\sqrt{n}$, ayant déjà fait $S_1 = P$, nous déterminerons les sommes suivantes S_2, S_3, S_4 , etc. au moyen des symboles $\left(\frac{2}{n}\right), \left(\frac{3}{n}\right), \left(\frac{4}{n}\right), \left(\frac{5}{n}\right)$, etc.

Or on trouve par les principes connus

$$\begin{aligned} \binom{2}{31} &= 1, \binom{3}{31} = -\binom{31}{3} = -1, \binom{4}{31} \text{ ou en général } \binom{e^2}{31} = 1, \\ \binom{5}{31} &= \binom{31}{5} = 1, \binom{6}{31} = \binom{2}{31} \cdot \binom{3}{31} = -1, \binom{7}{31} = -\binom{31}{7}, \\ &= -\binom{3}{7} = \binom{7}{3} = 1, \binom{8}{31} = \binom{2e^2}{31} = \binom{2}{31} = 1, \binom{9}{31} = 1, \\ \binom{10}{31} &= \binom{2}{31} \cdot \binom{5}{31} = 1, \text{ etc.,} \end{aligned}$$

on a donc

$$\begin{aligned} S_1 = S_3 = S_5 = S_7 = S_9 = S_{11} = S_{13} = S_{15} = S_{17} = S_{19} = P \\ S_2 = S_4 = Q. \end{aligned}$$

Ensuite par l'application des équations (1) on trouvera

$$\begin{aligned} A_1 &= 1 + \sqrt{-n} \\ A_2 &= -7 + \sqrt{-n} \\ A_3 &= -11 - \sqrt{-n} \\ A_4 &= 2 - 2\sqrt{-n} \\ A_5 &= 8 \\ A_6 &= -3 + \sqrt{-n} \\ A_7 &= -5 - \sqrt{-n} \\ A_8 &= 5 - \sqrt{-n}. \end{aligned}$$

Arrivé aux termes moyens A_7 et A_8 on peut se dispenser d'aller plus loin, car il est facile de voir qu'on doit changer simplement le signe de la partie réelle dans les coefficients précédents à compter de A_7 , ce qui donnera

$$A_9 = 3 + \sqrt{-n}$$

$$A_{10} = -8$$

$$A_{11} = -2 - 2\sqrt{-n}$$

$$A_{12} = 11 - \sqrt{-n}$$

$$A_{13} = 7 + \sqrt{-n}$$

$$A_{14} = -1 + \sqrt{-n}$$

$$A_{15} = -2.$$

C'est une suite nécessaire de ce que l'équation $4X = Y^2 + nZ^2$ ne doit pas changer de forme en mettant $\frac{1}{x}$ à la place de x , propriété sur laquelle nous reviendrons ci-après.

Connaissant les coefficients A qui servent à composer la fonction

$$Y + Z\sqrt{-n} = 2x^{15} + A_9x^{14} + A_{10}x^{13} + A_{11}x^{12} + \text{etc.},$$

on en déduira les valeurs des polynomes Y et Z , savoir :

$$Y = 2x^{15} + x^{14} - 7x^{13} - 11x^{12} + 2x^{11} + 8x^{10} - 3x^9 - 5x^8$$

$$+ 5x^7 + 3x^6 - 8x^5 - 2x^4 + 11x^3 + 7x^2 - x - 2$$

$$Z = x^{14} + x^{13} - x^{12} - 2x^{11} + x^9 - x^8 - x^7 + x^6 - 2x^4 - x^3$$

$$+ x^2 + x.$$

EXEMPLE II.

Soit $n = 37$, on aura

$$\binom{2}{n} = -1, \binom{3}{n} = 1, \binom{4}{n} = 1, \binom{5}{n} = -1, \binom{6}{n} = -1$$

$$\binom{7}{n} = 1, \binom{8}{n} = -1, \binom{9}{n} = 1, \binom{10}{n} = 1.$$

Delà

$$A_9 = 3 + \sqrt{-n}$$

$$A_{10} = -8$$

$$A_{11} = -2 - 2\sqrt{-n}$$

$$A_{12} = 11 - \sqrt{-n}$$

$$A_{13} = 7 + \sqrt{-n}$$

$$A_{14} = -1 + \sqrt{-n}$$

$$A_{15} = -2.$$

C'est une suite nécessaire de ce que l'équation $4X = Y' + nZ'$ ne doit pas changer de forme en mettant $\frac{1}{x}$ à la place de x , propriété sur laquelle nous reviendrons ci-après.

Connaissant les coefficients A qui servent à composer la fonction

$$Y + Z\sqrt{-n} = 2x^{15} + A_1x^{14} + A_2x^{13} + A_3x^{12} + \text{etc.},$$

on en déduira les valeurs des polynomes Y et Z , savoir :

$$\begin{aligned}
Y &= 2x^{15} + x^{14} - 7x^{13} - 11x^{12} + 2x^{11} + 8x^{10} - 3x^9 - 5x^8 \\
&\quad + 5x^7 + 3x^6 - 8x^5 - 2x^4 + 11x^3 + 7x^2 - x - 2 \\
Z &= x^{14} + x^{13} - x^{12} - 2x^{11} + x^9 - x^8 - x^7 + x^6 - 2x^4 - x^3 \\
&\quad + x^2 + x.
\end{aligned}$$

EXEMPLE II.

Soit $n = 37$, on aura

$$\begin{aligned}
\binom{2}{n} &= -1, \binom{3}{n} = 1, \binom{4}{n} = 1, \binom{5}{n} = -1, \binom{6}{n} = -1 \\
\binom{7}{n} &= 1, \binom{8}{n} = -1, \binom{9}{n} = 1, \binom{10}{n} = 1.
\end{aligned}$$

Delà

$$S_1 = S_2 = S_3 = S_4 = S_5 = S_6 = S_{10} = -\frac{1}{2} - \frac{1}{2}\sqrt{n}$$

$$S_7 = S_8 = S_9 = S_{11} = -\frac{1}{2} + \frac{1}{2}\sqrt{n},$$

et la substitution de ces valeurs dans les équations (1) donnera

$$A_1 = 1 + \sqrt{n}, A_2 = 10, A_3 = -4 + 2\sqrt{n}, A_4 = 15 - \sqrt{n},$$

$$A_5 = -5 + 3\sqrt{n}, A_6 = 17 - \sqrt{n}, A_7 = -8 + 2\sqrt{n},$$

$$A_8 = 11 - \sqrt{n}, A_9 = -4 + 2\sqrt{n}, A_{10} = 11 - \sqrt{n}.$$

Le terme moyen étant A_9 , il est inutile d'aller plus loin, et les coefficients qui suivent A_9 seront égaux à ceux qui le précèdent à intervalles égaux, de sorte qu'on aura

$$A_{10} = A_8 = 11 - \sqrt{n}, A_{11} = A_7 = -8 + 2\sqrt{n}, \text{ etc. ;}$$

et on en déduit les valeurs suivantes des fonctions Y et Z,

$$Y = 2x^{13} + x^{12} + 10x^{10} - 4x^{15} + 15x^{14} - 5x^{13} + 17x^{12} - 8x^{11} \\ + 11x^{10} - 4x^9 + 11x^8 - 8x^7 + 17x^6 - 5x^5 + 15x^4 - 4x^3 \\ + 10x^2 + x + 2$$

$$Z = x^{17} + 2x^{15} - x^{14} + 3x^{13} - x^{12} + 2x^{11} - x^{10} + 2x^9 \\ - x^8 + 2x^7 - x^6 + 3x^5 - x^4 + 2x^3 + x,$$

lesquelles satisfont à l'équation $4X = Y^2 - 37Z^2$.

Dans ces deux exemples les coefficients des fonctions Y et Z sont encore plus petits que $\frac{1}{2}n$; mais à compter de $n = 41$, on trouve des coefficients plus grands, ce qui devient encore plus marqué, lorsque franchissant un plus grand intervalle on prend $n = 61$. Voici les résultats de ces calculs qui feront suite au tableau de l'article 512.

<i>n</i>	Valeurs des polynomes Y et Z.
31	$Y = 2x^{35} + x^{34} - 7x^{33} - 11x^{32} + 2x^{31} + 8x^{30} - 3x^{29} - 5x^{28} + 5x^{27} + 3x^{26} - 8x^{25} - 2x^{24} + 11x^{23} + 7x^{22} - x - 2$ $Z = x^{34} + x^{33} - x^{32} - 2x^{31} + x^{30} - x^{29} - x^{28} + x^{27} + x^{26} - 2x^{25} - x^{24} + x^{23} + x$
37	$Y = 2x^{37} + x^{37} + 10x^{36} - 4x^{35} + 15x^{34} - 5x^{33} + 17x^{32} - 8x^{31} + 11x^{30} - 4x^{29} - 11x^{28} - 8x^{27} + 17x^{26} - 5x^{25} + 15x^{24} - 4x^{23} + 10x^{22} + x + 2$ $Z = x^{37} + 2x^{35} - x^{34} + 3x^{33} - x^{32} + 2x^{31} - x^{30} + 2x^{29} - x^{28} + 2x^{27} - x^{26} + 3x^{25} - x^{24} + 2x^{23} + x$
41	$Y = 2x^{41} + x^{41} + 11x^{40} + 16x^{39} + 14x^{38} + 29x^{37} + 30x^{36} + 22x^{35} + 36x^{34} + 34x^{33} + 20x^{32} + 34x^{31} + 36x^{30} + 22x^{29} + 30x^{28} + 29x^{27} + 14x^{26} + 16x^{25} + 11x^{24} + x + 2$ $Z = x^{41} + x^{40} + 2x^{39} + 4x^{38} + 3x^{37} + 4x^{36} + 6x^{35} + 4x^{34} + 4x^{33} + 4x^{32} + 6x^{31} + 4x^{30} + 4x^{29} + 4x^{28} + 4x^{27} + 4x^{26} + 6x^{25} + 4x^{24} + 3x^{23} + 4x^{22} + 2x^{21} + x^2 + x$
61	$Y = 2x^{61} + x^{61} + 16x^{60} - 7x^{59} + 32x^{58} - 20x^{57} + 63x^{56} - 33x^{55} + 72x^{54} - 54x^{53} + 89x^{52} - 62x^{51} + 88x^{50} - 89x^{49} + 95x^{48} - 81x^{47} + \text{etc.}$ $Z = x^{61} + 3x^{60} - 2x^{59} + 6x^{58} - 3x^{57} + 9x^{56} - 6x^{55} + 10x^{54} - 7x^{53} + 12x^{52} - 10x^{51} + 11x^{50} - 11x^{49} + 13x^{48} - \text{etc.}$

On voit dans ce tableau que pour le nombre 61 plusieurs des coefficients de Y sont plus grands que *n*, mais pour avoir une idée de la progression suivant laquelle les coefficients augmentent lorsque *n* est un nombre premier un peu grand, prenons par exemple *n* = 2521, nous aurons

$$\binom{2}{n} = 1, \binom{3}{n} = 1, \binom{4}{n} = 1, \binom{5}{n} = 1, \binom{6}{n} = 1, \binom{7}{n} = 1, \text{ etc. ,}$$

ce qui donne

$$S_1 = S_2 = S_3 = S_4 = S_5 = S_6 = S_7 = -\frac{1}{2} - \frac{1}{2}\sqrt{n}.$$

Substituant ces valeurs dans les équations (1), on en tire

$$\begin{aligned} A_1 &= 1 + \sqrt{n} & A_5 &= 84001 + 3613\sqrt{n} \\ A_2 &= 631 + \sqrt{n} & A_6 &= 836032 + 10312\sqrt{n} \\ A_3 &= 946 + 106\sqrt{n} & A_7 &= 2633212 + 69292\sqrt{n} \\ A_4 &= 34231 + 211\sqrt{n} & & \text{etc.} \end{aligned}$$

Ainsi les premiers termes des fonctions Y et Z seront, en faisant $1260 = m$

$$\begin{aligned} Y &= 2x^m + x^{m-1} + 631x^{m-2} + 946x^{m-3} \\ &\quad + 34231x^{m-4} + 84001x^{m-5} \\ &\quad + 836032x^{m-6} + 2633212x^{m-7} + \text{etc.} \\ Z &= x^{m-1} + x^{m-2} + 106x^{m-3} + 211x^{m-4} \\ &\quad + 3613x^{m-5} + 10312x^{m-6} \\ &\quad + 69292x^{m-7} + \text{etc.} \end{aligned}$$

On voit avec quelle rapidité les coefficients croissent dans l'une et l'autre fonction, mais cet accroissement n'a lieu que jusqu'au terme moyen; ensuite il fait place à un décroissement semblable, puisque les coefficients doivent être égaux à égale distance des extrêmes.

C'est en effet la loi à laquelle sont assujéties les fonctions Y et Z, puisque la substitution de x^{-1} à la place de x dans l'équation $4X = Y^2 - nZ^2$, n'y doit apporter aucun changement, après qu'on a fait disparaître le dénominateur commun. On voit par là que dans chaque fonction les coefficients des termes extrêmes ou également éloignés des extrêmes, doivent être égaux; mais ces coefficients sont-ils précédés du même signe ou de signes différents? c'est ce qu'il faut examiner.

Soit $1^{\circ} n = 4i - 1$ ou $m = \frac{1}{2}(n - 1) = 2i - 1$: puisque la fonction Z doit rester la même, ou du moins ne faire que changer de signe, en mettant x^{-1} à la place de x et multipliant le tout par x^n , cette fonction ne pourra avoir que l'une des deux valeurs suivantes :

$$\begin{aligned} \text{I. } Z &= \begin{cases} x^{n-1} + b_1 x^{n-3} + b_2 x^{n-5} \dots + b_{i-1} x^1 \\ + x + b_1 x^3 + b_2 x^5 \dots + b_{i-1} x^{2i-1} \end{cases} \\ \text{II. } Z &= \begin{cases} x^{n-1} + b_1 x^{n-3} + b_2 x^{n-5} \dots + b_{i-1} x^1 \\ -x - b_1 x^3 - b_2 x^5 \dots - b_{i-1} x^{2i-1} \end{cases} \end{aligned}$$

Or si la seconde valeur avait lieu, la supposition $x = 1$ donnerait $Z = 0$, et comme en même temps on aurait $X = \frac{x^n - 1}{x - 1} = n$, l'équation $4X = Y^2 + nZ'$ deviendrait $4n = Y^2$, équation impossible, puisque $4n$ n'est point un carré, donc la forme I a lieu nécessairement.

Cela posé cette forme I de la fonction Z doit être combinée avec l'une des deux formes que pourrait avoir la fonction Y , lesquelles sont

$$\begin{aligned} \text{I. } Y &= \begin{cases} 2x^n + x^{n-1} + a_1 x^{n-3} + a_2 x^{n-5} \dots + a_{i-1} x^1 \\ + 2 + x + a_1 x^3 + a_2 x^5 \dots + a_{i-1} x^{2i-1} \end{cases} \\ \text{II. } Y &= \begin{cases} 2x^n + x^{n-1} + a_1 x^{n-3} + a_2 x^{n-5} \dots + a_{i-1} x^1 \\ - 2 - x - a_1 x^3 - a_2 x^5 \dots - a_{i-1} x^{2i-1} \end{cases} \end{aligned}$$

Or si la forme I avait lieu, la supposition $x = -1$ donnerait $Y = 0$, et comme alors on aurait $X = 1$, l'équation $4X = Y^2 + nZ'$ deviendrait $4 = nZ'$, équation impossible ; donc la forme II de Y est celle qui a lieu nécessairement.

Donc lorsqu'on a $n = 4i - 1$, les fonctions Y et Z qui satisfont à l'équation $4X = Y^2 + nZ'$ ont nécessairement la

forme ici déterminée

$$Y = \begin{cases} 2x^n + x^{n-1} + a_1 x^{n-2} + a_2 x^{n-3} \dots + a_{i-1} x \\ -2 - x - a_1 x^2 - a_2 x^3 \dots - a_{i-1} x^{i-1} \end{cases}$$

$$Z = \begin{cases} x^{n-1} + b_1 x^{n-2} + b_2 x^{n-3} \dots + b_{i-1} x^i \\ + x + b_1 x^2 + b_2 x^3 \dots + b_{i-1} x^{i-1} \end{cases}$$

Le tableau que nous avons donné de ces fonctions pour quelques-unes des plus simples valeurs de n s'accorde avec ce résultat, mais il était nécessaire de démontrer l'existence de cette propriété indépendamment de toute induction.

Soit $2^\circ n = 4i + 1$ ou $m = 2i$, nous allons faire voir que la valeur de Z ne peut être que de la forme

$$Z = \begin{cases} x^{n-1} + b_1 x^{n-2} + b_2 x^{n-3} \dots + b_{i-1} x^{i+1} + b_i x^i \\ + x + b_1 x^2 + b_2 x^3 \dots + b_{i-1} x^{i-1} \end{cases}$$

qui ne changera pas en mettant x^{-1} à la place de x et multipliant le tout par x^n . Car si après le terme moyen $b_i x^i$ tous les signes changeaient, en sorte qu'on eût

$$Z = \begin{cases} x^{n-1} + b_1 x^{n-2} + b_2 x^{n-3} \dots + b_{i-1} x^{i+1} + b_i x^i \\ -x - b_1 x^2 - b_2 x^3 \dots - b_{i-1} x^{i-1} \end{cases}$$

la substitution de x^{-1} au lieu de x , donnerait, après avoir multiplié le tout par $-x^n$,

$$Z = \begin{cases} x^{n-1} + b_1 x^{n-2} + b_2 x^{n-3} \dots + b_{i-1} x^{i+1} - b_i x^i \\ -x + b_1 x^2 - b_2 x^3 \dots + b_{i-1} x^{i-1} \end{cases}$$

valeur qui ne pourrait être égale à la précédente qu'en supposant $b_i = 0$. Mais alors la supposition $x = 1$ donnerait $Z = 0$ et l'équation $4X = Y + nZ$ deviendrait $4n = Y$, équation

impossible. Donc la forme que nous avons donnée à la valeur de Z est la seule admissible.

Maintenant cette valeur de Z doit être combinée avec l'une ou l'autre de ces deux valeurs de Y

$$\begin{aligned} \text{I. } Y &= \begin{cases} 2x^n + x^{n-1} + a_1 x^{n-2} + a_2 x^{n-3} \dots + a_{i-1} x^{i+1} + a_i x^i \\ + 2 + x^{-1} + a_1 x^1 + a_2 x^2 \dots + a_{i-1} x^{i-1} \end{cases} \\ \text{II. } Y &= \begin{cases} 2x^n + x^{n-1} + a_1 x^{n-2} + a_2 x^{n-3} \dots + a_{i-1} x^{i+1} + a_i x^i \\ - 2 - x^{-1} - a_1 x^1 - a_2 x^2 \dots - a_{i-1} x^{i-1} \end{cases} \end{aligned}$$

Or si la seconde forme avait lieu, il faudrait qu'elle ne changeât pas, ou qu'elle changeât seulement de signe, en mettant x^{-1} à la place de x et multipliant tout par x^n , ce qui exigerait qu'on eût $a_i = 0$. Mais cette condition ne peut être remplie, puisqu'on sait qu'aucune des puissances de x ne peut manquer dans le polynome Y ; d'ailleurs si le coefficient a_i était zéro, la supposition $x=1$ dans la seconde forme donnerait $Y=0$, et alors l'équation $4X=Y^2-nZ^2$ deviendrait $4n=-nZ^2$ équation impossible; donc par cette double raison la première forme de Y est la seule admissible; donc dans le cas de $n=4i+1$ les fonctions Y et Z qui satisfont à l'équation $4X=Y^2-nZ^2$ seront toujours des formes suivantes:

$$\begin{aligned} Y &= \begin{cases} 2x^n + x^{n-1} + a_1 x^{n-2} + a_2 x^{n-3} \dots + a_{i-1} x^{i+1} + a_i x^i \\ + 2 + x^{-1} + a_1 x^1 + a_2 x^2 \dots + a_{i-1} x^{i-1} \end{cases} \\ Z &= \begin{cases} x^{n-1} + b_1 x^{n-2} + b_2 x^{n-3} \dots + b_{i-1} x^{i+1} + b_i x^i \\ + x + b_1 x^1 + b_2 x^2 \dots + b_{i-1} x^{i-1} \end{cases} \end{aligned}$$

résultat qui s'accorde avec tous les exemples compris dans notre tableau.

La méthode que nous avons donnée pour calculer les va-

leurs des fonctions Y et Z, ne laisse rien à désirer quand il s'agit de l'appliquer à une valeur particulière du nombre premier n ; mais pour parvenir à quelques résultats généraux, il sera bon de considérer la valeur de n sous une forme indéterminée qui la rende applicable à une infinité de nombres premiers. Et parce que les formules relatives aux nombres premiers $4i-1$, se déduisent aisément des formules relatives aux nombres premiers $4i+1$, nous allons nous occuper exclusivement de ceux-ci.

Observons d'abord que la forme $4i+1$ se divise en quatre autres, savoir :

$$24\lambda + 1, \quad 24\lambda + 5, \quad 24\lambda + 13, \quad 24\lambda + 17,$$

ce qui offre quatre cas à considérer.

Premier cas $n = 24\lambda + 1$.

Alors on aura $\binom{2}{n} = 1$, $\binom{3}{n} = \binom{n}{3} = 1$, $\binom{4}{n}$ ou en général $\binom{e}{n} = 1$. Nous nous arrêterons là, parce que pour aller plus loin, il faudrait connaître le reste que donne λ divisé par 5, ce qui exigerait une nouvelle subdivision. Au moyen de ces valeurs de $\binom{4}{n}$, on trouvera

$$S_1 = S_2 = S_3 = \dots = \frac{1}{5} \sqrt{n};$$

ensuite par les équations (1), on aura

$$A_1 = 1 + \sqrt{n}$$

$$A_2 = 1 + 6\lambda + \sqrt{n}$$

$$A_3 = 1 + 9\lambda + (1 + \lambda)\sqrt{n}$$

$$A_4 = 1 + 11\lambda + 3\lambda' + (1 + 2\lambda)\sqrt{n}.$$

Second cas $n = 24\lambda + 5$.

Alors on aura $\binom{2}{n} = -1$, $\binom{3}{n} = \binom{5}{3} = -1$, $\binom{4}{n} = 1$; ce qui donne

$$S_1 = S_2 = -\frac{1}{2} - \frac{1}{2}\sqrt{n}, \quad S_3 = S_4 = -\frac{1}{2} + \frac{1}{2}\sqrt{n},$$

et par l'application des équations (1), on aura

$$A_1 = 1 + \sqrt{n}$$

$$A_2 = 2 + 6\lambda$$

$$A_3 = -3\lambda + \lambda\sqrt{n}$$

$$A_4 = -2\lambda + 3\lambda' - \lambda\sqrt{n}.$$

Troisième cas, $n = 24\lambda + 13$.

Alors on aura $\binom{2}{n} = -1$, $\binom{3}{n} = 1$, $\binom{4}{n} = 1$, ensuite

$$S_1 = S_2 = S_3 = -\frac{1}{2} - \frac{1}{2}\sqrt{n}, \quad S_4 = -\frac{1}{2} + \frac{1}{2}\sqrt{n},$$

et par l'application des équations (1) on trouve

$$A_1 = 1 + \sqrt{n}$$

$$A_2 = 4 + 6\lambda$$

$$A_3 = -1 - 3\lambda + (1 + \lambda)\sqrt{n}$$

$$A_4 = 4 + 8\lambda + 3\lambda' - \lambda\sqrt{n}.$$

Quatrième cas, $n = 24\lambda + 17$.

Alors on aura $\binom{2}{n} = 1$, $\binom{3}{n} = -1$, $\binom{4}{n} = 1$; de là

$$S_1 = S_2 = S_4 = -\frac{1}{2} - \frac{1}{2}\sqrt{n}, \quad S_3 = -\frac{1}{2} + \frac{1}{2}\sqrt{n},$$

et en vertu des équations (1);

$$\begin{aligned} A_1 &= 1 + \sqrt{n} \\ A_2 &= 5 + 6\lambda + \sqrt{n} \\ A_3 &= 7 + 9\lambda + (1 + \lambda)\sqrt{n} \\ A_4 &= 4 + 7\lambda + 3\lambda^2 + (2 + 2\lambda)\sqrt{n} \end{aligned}$$

Ces formules pour les nombres premiers $4i+1$, considérés sous les quatre formes $24\lambda+1$, $+5$, $+13$, $+17$, dont ils sont susceptibles, s'appliquent aux nombres premiers $4i-1$, considérés également sous leurs quatre formes $24\lambda-1$, -5 , -13 , -17 . Il suffit pour cela de changer le signe de λ dans les formules précédentes et en même temps le signe de n dans l'équation $4X=Y-nZ$ relative aux nombres premiers $4i+1$; on aura ainsi les valeurs de A qui satisfont à l'équation $4X=Y+nZ$ relative aux nombres premiers $4i-1$; nous les avons réunies dans le tableau suivant :

n	A_1	A_2	A_3	A_4
$24\lambda-1$	$1+\sqrt{-n}$	$1-6\lambda+\sqrt{-n}$	$1-9\lambda+(1-\lambda)\sqrt{-n}$	$1-11\lambda+3\lambda^2+(1-2\lambda)\sqrt{-n}$
$24\lambda-5$	$1+\sqrt{-n}$	$2-6\lambda$	$3\lambda-\lambda\sqrt{-n}$	$2\lambda+3\lambda^2+\lambda\sqrt{-n}$
$24\lambda-13$	$1+\sqrt{-n}$	$4-6\lambda$	$-1+3\lambda+(1-\lambda)\sqrt{-n}$	$4-8\lambda+3\lambda^2+\lambda\sqrt{-n}$
$24\lambda-17$	$1+\sqrt{-n}$	$5-6\lambda+\sqrt{-n}$	$7-9\lambda+(1-\lambda)\sqrt{-n}$	$4-7\lambda+3\lambda^2+(2-2\lambda)\sqrt{-n}$

Ainsi on voit que pour tout nombre premier $n=24\lambda-1$, les premiers termes des valeurs de Y et de Z seront

$$Y = 2x^n + x^{n-1} + (1-6\lambda)x^{n-2} + (1-9\lambda)x^{n-3} + (1-11\lambda+3\lambda^2)x^{n-4} + \text{etc.}$$

$$Z = x^{n-1} + x^{n-2} + (1-\lambda)x^{n-3} + (1-2\lambda)x^{n-4} + \text{etc.}$$

Et dans cette formule on remarquera que les quatre premiers coefficients de Y , savoir $2, 1, 1-6\lambda, 1-9\lambda$, sont toujours moindres que $\frac{1}{3}n$, mais le coefficient suivant $1-11\lambda+3\lambda^2$, qui est de l'ordre $3\lambda^2$ ou $\frac{n^2}{192}$, devient bientôt plus grand que n ; ainsi faisant $\lambda=13$ ou $n=311$, on a $1-11\lambda+3\lambda^2=365$.

Ces deux premiers tableaux pour les nombres premiers $4i+1$ et $4i-1$, ne s'étendent pas au-delà de A_1 qui donne les coefficients de x^{m-1} dans Y et Z ; pour aller plus loin, il faut subdiviser chacune des valeurs $n=24\lambda+1, 5, 13, 17$, en quatre autres par la substitution des cinq valeurs $\lambda=5\mu, 5\mu+1, 5\mu+2, 5\mu+3, 5\mu+4$, dont une doit être rejetée, comme ne donnant pas pour n des nombres premiers; voici ces subdivisions:

<i>Valeur principale de n.</i>	<i>Ses quatre sous-divisions.</i>
$24\lambda+1$	$120\mu+1, 120\mu+49, 120\mu+73, 120\mu+97$
$24\lambda+5$	$120\mu+29, 120\mu+53, 120\mu+77, 120\mu+101$
$24\lambda+13$	$120\mu+13, 120\mu+37, 120\mu+61, 120\mu+109$
$24\lambda+17$	$120\mu+17, 120\mu+41, 120\mu+89, 120\mu+113$

Appliquant notre méthode à ces différents cas, on trouvera pour chacun d'eux l'expression générale du coefficient A_3 et celle de A_6 , l'une renfermant des termes affectés de μ^2 et $\mu^2\sqrt{n}$, l'autre des termes affectés de $\mu^2\sqrt{n}$ et μ^3 ; on en conclura que le coefficient de x^{m-6} dans Y , étant de l'ordre μ deviendra bientôt plus grand que n^2 , ce qui manifeste l'augmentation progressive des coefficients de Y . On voit en même temps que le nombre et la complication des formules augmen-

tent rapidement avec la valeur de n , ce qui les rend peu propres à la solution des cas particuliers. C'est pourquoi il suffira de développer ici les formules relatives à l'une de nos subdivisions; nous choisirons pour cet effet la valeur $n = 120\mu + 61$.

On trouve alors dans le cas de $n = 24\lambda + 13$ dont cette subdivision fait partie

$$S_1 = S_3 = S_4 = -\frac{1}{5} - \frac{1}{5}\sqrt{n}, \quad S_2 = -\frac{1}{5} + \frac{1}{5}\sqrt{n}.$$

On aura de plus $\binom{5}{n} = \binom{61}{5} = 1$, $\binom{6}{n} = 1$, ce qui donne $S_5 = S_1$ et $S_6 = S_2$.

Cela posé dans le cas principal $n = 24\lambda + 13$, on a trouvé les valeurs de A_1, A_2, A_3, A_4 , dans lesquelles il faudra substituer la valeur $\lambda = 5\mu + 2$, ce qui donnera, pour la division $n = 120\mu + 61$, les valeurs

$$A_1 = 1 + \sqrt{n}$$

$$A_2 = 16 + 30\mu$$

$$A_3 = -7 - 15\mu + (3 + 5\mu)\sqrt{n}$$

$$A_4 = 32 + 100\mu + 75\mu^2 - (2 + 5\mu)\sqrt{n}.$$

Au moyen de ces valeurs on trouvera par les équations (1):

$$A_5 = -20 - \frac{195}{2}\mu - \frac{225}{2}\mu^2 + \left(6 + \frac{29}{2}\mu + \frac{15}{2}\mu^2\right)\sqrt{n}$$

$$A_6 = 63 + 246\mu + 280\mu^2 + 75\mu^3 - (3 + 14\mu + 15\mu^2)\sqrt{n}.$$

Et l'on voit que le terme $75\mu^3$ qui fait partie de A_6 deviendra plus grand que n si on a $n > \frac{(120)^3}{75}$ ou $n > 23040$.

Pour aller plus loin, c'est-à-dire pour trouver les valeurs

de A , et A_2 , il faudrait au lieu de μ substituer l'une des six valeurs $7\mu, 7\mu+1, 7\mu+3, 7\mu+4, 7\mu+5, 7\mu+6$, c'est-à-dire il faudrait subdiviser la forme $n=120\mu+61$ en six autres

$$n=840\mu+61, 181, 421, 541, 661, 781;$$

alors A_7 contiendrait un terme de l'ordre $\mu^3\sqrt{n}$, et A_2 un terme de l'ordre μ^4 . Il est inutile d'entrer dans de plus grands détails; nous déduirons seulement des valeurs précédentes de $A, A_1, \dots, A_6$ celles des fonctions Y et Z développées jusqu'à la puissance x^{n-6} ; elles donnent pour le nombre premier $n=120\mu+61$,

$$Y=2x^n+x^{n-1}+(16+30\mu)x^{n-2}-(7+15\mu)x^{n-3} \\ + (32+100\mu+75\mu^2)x^{n-4} - \left(20+\frac{195}{2}\mu+\frac{225}{2}\mu^2\right)x^{n-5} \\ + (63+246\mu+280\mu^2+75\mu^3)x^{n-6} - \text{etc.}$$

$$Z=x^{n-1}+(3+5\mu)x^{n-2}-(2+5\mu)x^{n-3} \\ + \left(6+\frac{29}{2}\mu+\frac{15}{2}\mu^2\right)x^{n-4} - (3+14\mu+15\mu^2)x^{n-5} \\ - \text{etc.}$$

On en déduirait pour le cas de $n=120\mu-61$, les formules suivantes qui satisfont à l'équation $4X=Y'+nZ'$,

$$Y=2x^n+x^{n-1}+(16-30\mu)x^{n-2}-(7-15\mu)x^{n-3} \\ + (32-100\mu+75\mu^2)x^{n-4} - \left(20-\frac{195}{2}\mu+\frac{225}{2}\mu^2\right)x^{n-5} \\ + (63-246\mu+280\mu^2-75\mu^3)x^{n-6} - \text{etc.}$$

$$Z=x^{n-1}+(3-5\mu)x^{n-2}-(2-5\mu)x^{n-3} \\ + \left(6-\frac{29}{2}\mu+\frac{15}{2}\mu^2\right)x^{n-4} - (3-14\mu+15\mu^2)x^{n-5} - \text{etc.}$$

Dans les deux cas on a fait $m=\frac{1}{2}(n-1)$.

de A et A'. Il faudrait au lieu de a substituer dans les 2^e valeurs $2x + 1, 2x + 2, 2x + 3, 2x + 4, 2x + 5, 2x + 6, 2x + 7$ etc. et ainsi de suite. On obtiendrait ainsi les valeurs de a suivantes :

$$a = 2x + 1, 2x + 2, 2x + 3, 2x + 4, 2x + 5, 2x + 6, 2x + 7, \dots$$

On a vu que A est un nombre de l'ordre 2^m et A' un nombre de l'ordre 2^n . Il est facile d'entre dans le plus grand détail : sans détails on obtient les valeurs précédentes de A, A', etc. et les nombres Y et X des équations précédentes. On obtient pour la somme des puissances 2^m :

$$Y = 2^m + 2^{m-1} + 2^{m-2} + \dots + 2 + 1 = 2^m - 1$$

$$X = 2^n + 2^{n-1} + 2^{n-2} + \dots + 2 + 1 = 2^n - 1$$

On obtient pour le cas de $n = 2m - 1$ les formules suivantes par exemple à l'équation $AX = Y + nX$.

$$Y = 2^m - 1, X = 2^{2m-1} - 1$$

$$2^m - 1 + 2^{2m-1} - 1 = 2^m - 1 + 2^{2m-1} - 1$$

$$2^m - 1 + 2^{2m-1} - 1 = 2^m - 1 + 2^{2m-1} - 1$$

Dans les deux cas on a $n = 2m - 1$.